

別紙 訂正内容

OP165のオロンディスウルトラSCについて、有効成分名並びに当該成分を含む農薬の総使用回数の記載に誤りがありました。

P165 訂正前

ぶどう病害防除基準掲載農薬一覧①

農薬名	RACコード	有効成分名	本剤の使用回数	当該成分を含む農薬の総使用回数	適用病害名													
					黒とう病	べと病	晩腐病	灰色かび病	うどんこ病	さび病	褐斑病	つる割病	白腐病	すす点病	白紋羽病			
トップジンMペースト	1	チオファネートメチル	3	5※1			○							○				
===== 中略 =====																		
オロンディスウルトラSC	40	ベンチアバリカルフィソプロピル	2	2	○													
	49	オキサチアビプロリン		3														
アリエッティ水和剤	P7	ホセチル	3	3	○													

※1 塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内
 ※2 休眠期の処理は1回以内、散布は3回以内 ※3 休眠期は1回以内、生育期は2回以内
 ※4 散布は1回以内、土壌灌注は1回以内



P165 訂正後

ぶどう病害防除基準掲載農薬一覧①

農薬名	RACコード	有効成分名	本剤の使用回数	当該成分を含む農薬の総使用回数	適用病害名													
					黒とう病	べと病	晩腐病	灰色かび病	うどんこ病	さび病	褐斑病	つる割病	白腐病	すす点病	白紋羽病			
トップジンMペースト	1	チオファネートメチル	3	5※1			○							○				
===== 中略 =====																		
オロンディスウルトラSC	40	マンジプロバミド	2	3	○													
	49	オキサチアビプロリン		2														
アリエッティ水和剤	P7	ホセチル	3	3	○													

※1 塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内
 ※2 休眠期の処理は1回以内、散布は3回以内 ※3 休眠期は1回以内、生育期は2回以内
 ※4 散布は1回以内、土壌灌注は1回以内