

各都道府県 観光関係担当部局 御中

観光庁参事官（旅行振興）

エチオピア連邦民主共和国におけるマールブルグ病に係る注意喚起について（周知依頼）

平素より感染症対策の推進につきまして、御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。

令和7年11月14日、エチオピア連邦民主共和国においてマールブルグ病の発生が確認されました。同日時点で9例の症例が報告されており、厚生労働省はマールブルグ病について情報収集、情報提供及び各検疫所を通じた空港等における海外渡航者に対する注意喚起を行うこととなりました。

これを受け、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課より、別添のとおり、旅行業関係団体及び空港会社等を通じた海外渡航者への注意喚起に係る協力依頼がありました。

マールブルグ病は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第6条第2項第6号に規定された一類感染症で、同法第12条により、感染を診断した医師は都道府県知事等に対して患者の氏名等を届け出るとともに、当該都道府県知事等は届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならないこととされております。このため、エチオピア連邦民主共和国に滞在している間や、同国から帰国後に疑わしき症状が出現した場合には、早期に医療機関を受診し、適切な診断及び治療を受けることが重要です。

つきましては、各都道府県におかれましては、本件について御周知いただけますようよろしくお願ひいたします。

【別添】

- ・（別添）厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課事務連絡
「エチオピア連邦民主共和国におけるマールブルグ病に係る注意喚起について」

事務連絡
令和7年11月20日

国土交通省大臣官房危機管理室 御中

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課

エチオピア連邦民主共和国におけるマールブルグ病に係る注意喚起について

令和7年11月14日、エチオピア連邦民主共和国においてマールブルグ病の発生が確認されました。同日時点で、同国南エチオピア州ジンカ町にて9例のマールブルグ病の症例が報告されています。

アフリカでのマールブルグ病の発生は散発的で、これまでに赤道ギニア共和国、タンザニア連合共和国、ガーナ共和国、ギニア共和国、ウガンダ共和国、アンゴラ共和国、コンゴ民主共和国、ケニア共和国、南アフリカ共和国及びルワンダ共和国で発生が確認されていますが、エチオピア連邦民主共和国では今回初めて確認されました。

エチオピア連邦民主共和国に滞在している間や、同国から入国後、疑わしい症状が出現した場合には、早期に医療機関を受診し、適切な診断及び治療を受けることが重要です。

厚生労働省は本件について、引き続き情報収集を実施し、必要に応じて情報提供を行うとともに、各検疫所を通じて空港等においても、エチオピア連邦民主共和国でマールブルグ病が発生している旨を記載したポスター（別添1、2）を掲示すること等によって、

- ・ エチオピア連邦民主共和国への渡航者に対し、マールブルグ病の発生及び流行の状況並びに必要な注意事項について、情報提供すること
- ・ エチオピア連邦民主共和国に渡航又は滞在したことがある者に対し、入国の際に体調に異常がある場合は、検疫官への自己申告を促すこと

について、海外渡航者への注意喚起を行っていただくよう依頼しているところです。


つきましては、旅行業関係団体及び空港会社等を通じて海外渡航者に対して広く注意喚起いただきますよう御協力の程よろしくお願いします。

エチオピアにおいて マールブルグ病 発生中!


エチオピア
南エチオピア州
ジンカ町にて
患者が発生
しています。

主な症状

3~10日の潜伏期間のあと、突然の高熱、頭痛、筋肉痛、発疹、咽頭痛などに続き、嘔吐、下痢が現れ、重症化すると中枢神経症状や体のいろいろな部分からの出血を生じ、死に至ることもあります。



感染経路
コウモリとの接触や、
感染者(遺体含む)の
血液や体液等
との接触



現地に渡航された方で気になる症状がある方は、検疫官にご相談ください。

この病気に対する確立された治療法やワクチンは、今のところありません。流行地域や動物(特にコウモリ)に近づかないことが重要です。

感染した人の血液や体液、これらに汚染された可能性のあるもの、動物(死体を含む)に触らないでください。

詳しくは
→ → →

検疫所ホームページ FORTH
<https://www.forth.go.jp/index.html>




FORTH マールブルグ病



Ethiopia Marburg Virus Disease Outbreak!


Ethiopia

In Southern Ethiopia Region, Jinka Town, cases have been reported.



Symptoms

After an incubation period of 3 to 10 days, symptoms include sudden high fever, headache, muscle pain, rash, and throat pain, followed by vomiting and diarrhea, and in severe cases, central nervous system symptoms and bleeding from various parts of the body, can lead to death.



If you have any concerning symptoms after traveling to this region, please consult a quarantine officer.

There is currently no established treatment or vaccine for this disease. It is important to avoid outbreak areas and animals (especially bats). Do not touch the blood or body fluids of infected persons, objects that may be contaminated, or animals (including carcasses).

→ → →
For more details

Quarantine Station HP FORTH
<https://www.forth.go.jp/index.html>

FORTH Marburg Disease

