

クビアカツヤカミキリに登録のある主な農薬（モモ）

2026/7/8現在の登録内容

RAC	対象	薬剤名	希釈倍率 及び使用量	使用時期	使用方法	本剤の 使用回数	備考	その他登録のある害虫
1B	成虫	スミチオン乳剤	1000倍	成虫発生初期 但し、収穫3日前まで	散布	6回以内	MEP:6回以内 (但し、樹幹処理は1回以内)	アブラムシ類、クワシロカイガラムシ、カメムシ類、ハマキムシ類、モモハモグリガ、クワコナカイガラムシ、モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、ナシヒメシンクイ（心折防止）
3A	成虫	アグロスリン水和剤	1000倍	収穫前日まで	散布	5回以内	シールドトップ: 5回以内	アブラムシ類、カメムシ類、モモハモグリガ、アカエグリバ、オオエグリバ、ヒメエグリバ、アケビコノハ、シンクイムシ類
4A	成虫	アクタラ顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	散布	3回以内	アクトラン: 3回以内	アブラムシ類、カメムシ類、ミカンキイロアザミウマ、モモハモグリガ、シンクイムシ類
	成虫	ダントツ水溶剤	2000倍	収穫7日前まで	散布	3回以内	ダントツ: 3回以内	アブラムシ類、カメムシ類、コガネムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類
	成虫	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	散布	3回以内	アクトラン: 3回以内	アブラムシ類、カイガラムシ類、カメムシ類、コガネムシ類成虫、コスカシバ、アザミウマ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類、モモチョッキリゾウムシ
14	成虫	パダンSG水溶剤	1500倍	収穫14日前まで	散布	3回以内	パダン: 3回以内	アブラムシ類
21A	成虫	ハチハチフロアブル	1000～2000倍	成虫発生期 但し、収穫前日まで	散布	2回以内	ハチハチ: 2回以内	アブラムシ類、モモサビダニ、アザミウマ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類
22B	成虫	アクセルフロアブル	1000倍	収穫前日まで	散布	2回以内	メダニ: 4回以内 (但し、樹幹散布は2回以内、散布は2回以内) 作目名は「もも類」で登録	コスカシバ、ハマキムシ類、ケムシ類
			100～200倍	収穫前日まで	樹幹散布	2回以内		
28	成虫	テッパン液剤	2000倍	収穫前日まで	散布	2回以内	テッパン: 2回以内	カメムシ類、コガネムシ類、コスカシバ、ハマキムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類

クビアカツヤカミキリに登録のある主な農薬（スモモ）

2026/7/8現在の登録内容

RAC	対象	薬剤名	希釈倍率 及び使用量	使用時期	使用方法	本剤の 使用回数	備考	その他登録のある害虫
3A	成虫	アグロスリン水和剤	1000倍	収穫前日まで	散布	2回以内	シベルメトリン：2回以内	カメモシ類、シンクイムシ類
4A	成虫	アクタラ顆粒水溶剤	2000倍	収穫7日前まで	散布	2回以内	チアメトリン：2回以内 「小粒核果類」で登録	アブラムシ類
	成虫	ダントツ水溶剤	2000倍	収穫3日前まで	散布	3回以内	クロチニジン：3回以内	アブラムシ類、カメモシ類
	成虫	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	散布	3回以内	アセチアリド：3回以内	アブラムシ類、カイガラムシ類、スモミハバチ、シンクイムシ類
14	成虫	パダンSG水溶剤	1500倍	収穫14日前まで	散布	3回以内	カルタップ：3回以内	アブラムシ類
22B	成虫	アクセルフロアブル	1000倍	収穫前日まで	散布	2回以内	メタフルザン：4回以内 (但し、樹幹散布は2回以内、散布は2回以内) 作目名は「もも類」で登録	コスカシバ、ハマキムシ類、ケムシ類
			100～200倍	収穫前日まで	樹幹散布	2回以内		
28	成虫	テッパン液剤	2000倍	収穫前日まで	散布	2回以内	シラニプロール：2回以内 「小粒核果類」で登録	ハマキムシ類、モモヒメヨコバイ、シンクイムシ類、ケムシ類

クビアカツヤカミキリに登録のある主な農薬（ネクターリン）

2026/7/8現在の登録内容

RAC	対象	薬剤名	希釈倍率 及び使用量	使用時期	使用方法	本剤の 使用回数	備考	その他登録のある害虫
3A	成虫	アグロスリン水和剤	1000倍	収穫前日まで	散布	2回以内	シールドトリツ：2回以内	アブラムシ類、カメムシ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類
4A	成虫	アクタラ顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	散布	3回以内	アクトキッド：3回以内	アブラムシ類、カメムシ類、ミカンキイロアザミウマ、モモハモグリガ、シンクイムシ類
14	成虫	パダンSG水溶剤	1500倍	収穫14日前まで	散布	3回以内	カルタップ：3回以内	アブラムシ類
21A	成虫	ハチハチフロアブル	1000～2000倍	成虫発生期（但し、収穫前日まで）	散布	2回以内	トルフェンビラト：2回以内	アブラムシ類、モモサビダニ、アザミウマ類、モモハモグリガ、シンクイムシ類
22B	成虫	アクセルフロアブル	1000倍	収穫前日まで	散布	2回以内	メタフミダゾール：4回以内 （但し、樹幹散布は2回以内、散布は2回以内） 作目名は「もも類」で登録	コスカシバ、ハマキムシ類、ケムシ類
			100～200倍	収穫前日まで	樹幹散布	2回以内		

クビアカツヤカミキリに登録のある主な農薬（オウトウ）

2026/7/8現在の登録内容

RAC	対象	薬剤名	希釈倍率 及び使用量	使用時期	使用方法	本剤の 使用回数	備考	その他登録のある害虫
3A	成虫	アグロスリン水和剤	1000倍	収穫3日前まで	散布	2回以内	シバノトリツ：2回以内	カメムシ類、ショウジョウバエ 類、オウトウハマダラミバエ
4A	成虫	アクタラ顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	散布	2回以内	アタミキム：2回以内	カメムシ類、オウトウショウ ジョウバエ
	成虫	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	散布	1回	アタミキム：1回	カイガラムシ類、カメムシ類、 アザミウマ類、オウトウショウ ジョウバエ
28	成虫	テッパン液剤	2000倍	収穫前日まで	散布	2回以内	シバノトリツ：2回以内	カメムシ類、マメコガネ、コス カシバ、ハマキムシ類、オウト ウショウジョウバエ

クビアカツヤカミキリに登録のある主な農薬（ウメ）

2026/7/8現在の登録内容

RAC	対象	薬剤名	希釈倍率 及び使用 量	使用時期	使用方法	本剤の 使用回数	備考	その他登録のある害虫
1B	成虫	スミチオン乳剤	1000倍	成虫発生初期 但し、収穫14日前まで	散布	2回以内	MEP:2回以内	アブラムシ類、ハマキムシ類、アメリ カシロヒトリ
3A	成虫	アグロスリン水和剤	2000倍	収穫7日前まで	散布	3回以内	シバノムシ：3回以内	アブラムシ類、モモヒメヨコバイ
4A	成虫	アクタラ顆粒水溶剤	2000倍	収穫7日前まで	散布	2回以内	アサマシメ：2回以内	アブラムシ類、カメムシ類
	成虫	ダントツ水溶剤	2000倍	収穫前日まで	散布	3回以内	クロアザミ：3回以内	アブラムシ類、カメムシ類、ケシキス イ類、ケムシ類
	成虫	モスピラン顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日まで	散布	3回以内	アサマシメ：3回以内	アブラムシ類、カイガラムシ類、ケシ キスイ類、ノコメトガリキリガ
22B	成虫	アクセルフロアブル	1000倍	収穫前日まで	散布	3回以内	メカミジ：3回以内	ケシキスイ類、ケムシ類
28	成虫	テッパン液剤	2000倍	収穫前日まで	散布	2回以内	シラネアザミ：2回以内 「小粒核果類」で登録	ハマキムシ類、モモヒメヨコバイ、シ ンクイムシ類、ケムシ類