

待つ



様子を見ても大丈夫
通常の診療時間内に
受診しましょう

- 吐き気が治まった後、水分がとれる
- 全身の状態が悪くない

行く



救急外来を
受診しましょう

- けいれん(ひきつけ)をとまったり、意識がぼんやりしている
👉 至急受診が必要(救急車を呼ぶ)
- 10~30分おきに腹痛をくり返す(激しく泣く)血便がある
👉 至急受診が必要
- ひどい腹痛、強い頭痛をとまったり、強く頭を打った後
👉 至急受診が必要
- 嘔吐と下痢を同時に何回もくり返す
- 吐いたものに血液や胆汁(緑色)が混じる
- 何回も吐いた後、コーヒークサのような色や黄色の胃液になった
- おしっこが半日くらい出ない
- 唇や舌が乾いている
- 強く頭を打った後は 📞 P-21 参照
- 顔色が悪いのが回復しない



注意すること

食べ物・飲み物に注意しましょう。

吐き気が強いとき → 飲食するとかえって吐くので、1~2時間は控える。

嘔吐の間隔が長くなったら → 人肌程度にあたためた子ども用イオン飲料(スポーツ飲料以外)、経口補水液を少しずつ頻回に飲ませる。
胃腸を休めるために固形物は与えない。

吐き気が治まったら → 消化のよいおかゆやうどんなどの炭水化物を少量ずつ与える(油の多いものや乳製品、ラーメンなどは避ける)。