

ヒアリ

ねん がつ とくていがいらいせいぶつ こくない
2017年5月に特定外来生物のヒアリが国内で



はじ かくにん
初めて確認されました。

生態

こうげきせい つよ す しげき
攻撃性が強く、巣を刺激したりすると

しゅうだん ふくぶ さき どくはり なんと さ
集団でおそい、腹部の先の毒針で何度も刺
します。

生息場所

くさち ひかくてきひら かんきょう こ
草地など比較的開けた環境を好みます。

巣

かいほうてき とち のうこうち こうえん す
開放的な土地（農耕地、公園など）に巣

づか
（アリ塚）をつくります。アリ塚は土でつくられています。一般的なアリ塚の

たか さいだいたか かくにん
高さは15.0cmから50.0cm（最大高さ90.0cmが確認されています。）で、ド
ム状です。

症状

- やけど いた かゆ はつねつ じんましん はげ どうき
火傷のような痛み、痒み、発熱、蕁麻疹、激しい動悸など。
- 人によってはアレルギー しょうじょう 症 状 をともなうことがあります。

ヒアリ（働きアリ）

たいちよう
体長 : 約2.0~6.0mm
たいしよく
体色 : 赤茶色
(ふくぶはくろ
腹部は暗め)



アリ塚（ヒアリの巣）

しゃしん かんきょうしょうてい
写真：環境省提供

刺された場合

- 医療機関を受診しましょう。(アリの刺されたことを伝えましょう)

予防対策

- 靴を履くときは、靴やサンダルの中にアリがないことを確認してから履きましょう。
- ヒアリの毒の中にはハチの毒と同じ成分が入っています。ハチに刺されたことがある人は、ヒアリに刺されないよう注意しましょう。(万が一に備え、医療機関を受診・相談し、アドレナリン自己注射キット(エピペン)を持ち歩くのもよいでしょう)

アリやアリ塚には触れないようにしましょう。

駆除方法

- 家庭用殺虫剤の使用
- ベイト剤(毒餌をアリの巣に持ち帰らせ殺虫する)の使用

参考資料

環境省自然環境局：ストップ・ザ・ヒアリ(平成21年3月)