

令和7年 主要果樹の生育状況

調査日
令和7年5月14日

果樹試験場農業革新支援スタッフ
(現地調査: 中北農務事務所、
峡東農務事務所)

種 類	品 種	調査場所	生育ステージ	前年比	平年比※1
スモモ	ソルダム	南ア市落合	果径:32.8mm	1 日程度遅い	4 日程度早い
		甲州市塩山上塩後※3	幼果期:23～35mm (平均28.2mm)	(3日程度遅い)	(1日程度遅い)
	貴 陽	笛吹市石和町(棚)(富士見地区)	果径33.4mm (果径30mm5/8)	7日遅い	2日遅い
		南ア市落合(棚)	果径:35.6mm	2 日程度早い	4日程度早い
		甲州市塩山上塩後	幼果期:26～35mm (平均31.1mm)	8日遅い	4日遅い
	サマーエンジェル	笛吹市境川町(棚)	果径30.2mm (果径30mm5/14)	9日遅い	7日遅い
		甲州市塩山上塩後※3	幼果期:30～36mm (平均32.1mm)	(6日程度遅い)	(平年並み)
モ モ	白 鳳	笛吹市石和町(富士見地区)※3	果径35.1mm (果径30mm5/10)	9日遅い	—
		山梨市加納岩※2	幼果期:34～42mm (平均38.0mm)	—	—
		韮崎市大草町	果径:26.9mm(バラツキあり) ほぼ摘果済	7日程度遅い	4日程度遅い
オウトウ	高 砂 (雨除け)	南ア市在家塚	果径:18.7mm	1 日程度早い	3 日程度早い
		甲州市塩山下萩原※3	幼果期:16～18mm (平均17.0mm)	(5日程度遅い)	(1日程度遅い)
	佐藤錦 (雨除け)	南ア市在家塚	果径:17.5mm	前年並	1 日程度遅い
		甲州市塩山下萩原※3	幼果期:14～18mm (平均16.3mm)	(1日程度遅い)	(2日程度遅い)
ブドウ	デラウェア (ホース)	甲府市善光寺	展葉13.2枚(満開。1回目GA処理:5/4)	5 日程度遅い	3 日程度遅い
		山梨市万力	展葉11.5～14枚 (平均12.3枚)	6日遅い	—
	デラウェア (促進)	甲府市善光寺	展葉13.1枚(離散日:5/1。1回目GA処理:5/10,11)	4 日程度遅い	1 日程度遅い
		笛吹市石和町(富士見地区)※4	展葉10.6枚 (展葉10枚5/11)	昨年並み	2日遅い
	巨 峰 (露地)	甲府市蓬沢※3	展葉13.0枚	前年並み	2 日程度早い
		甲州市勝沼町	展葉7～9枚(平均8.1枚) (展葉始め:4/19)	6日遅い	3日遅い
	シャイン マスカット (露地)	笛吹市御坂町(成田)※5	展葉7.4枚 (展葉6枚5/8)	7日遅い	10日遅い
		甲州市勝沼町	展葉5.5～7.5枚(平均6.1枚) (展葉始め:4/20)	6日遅い	3日遅い
リンゴ	つがる	韮崎市上ノ山	果径:16.3mm(バラツキあり) 中心果のみに摘果済	10日程度遅い	10日程度遅い
	ふ じ	韮崎市上ノ山	果径:14.2mm(バラツキあり)	4日程度遅い	8日程度遅い
		北杜市高根町	果径:10.8mm(バラツキあり)	7日程度遅い	6日程度遅い

※1平年比は、H27～R6の10年間平均との比較。

※2 調査樹変更、※3 調査園変更、※4 1月中旬メリット青散布、※5 12月末CX-10散布

()は参考値