特定外来生物 クビアカツヤカミキリ 警戒中!!

～発生時には情報提供をお願いします～

山梨県では未確認ですが、近隣の県で確認されています。早期発見が重要です！

山梨県病害虫防除所　TEL：0551－28－2941

【確認ポイント】

- 胸部は赤く、コブ状の突起がある
- 体は黒色でツヤがある
- 体長は2～4㎝
- 幼虫がモモ、スモモ、サクラなどバラ科樹木を食い荒らす

写真提供：埼玉県環境科学国際センター

【生態】

・樹木の中でさなぎから成虫になり、縦長の孔をあけて脱出

・成虫が6～8月に発生

・6～8月樹皮の割れ目に産卵
・ふ化後樹木の中に食入

・幼虫が樹木の内部で2～3年かけて成長
・幼虫が入り込んだ樹木からはうどん状のフラスを排出
・成長が進むと大量のフラスを排出

写真提供：埼玉県環境科学国際センター

【フラスの見分け方】

※フラス：木くずと虫糞などが混じった物

クビアカツヤカミキリのフラス
（太く長くつながる）

コスカシバのフラス
（球状）

ゴマダラカミキリのフラス
（固まらない）

蟻道
（蟻が移動するトンネル）

写真提供：（国研）森林研究・整備機構　森林総合研究所

発見したら、地域の農務事務所または病害虫防除所へご連絡ください。

中北農務事務所　農業農村支援課	TEL：0551－23－3291
峡東農務事務所　農業農村支援課	TEL：0553－20－2830
峡南農務事務所　農業農村支援課	TEL：055－240－4131
富士・東部農務事務所　農業農村支援課	TEL：0554－45－7832

※農地以外で発見した場合は、市町村または県林務環境事務所までご連絡ください。