

## 6月3、4日の降雹・強風に対する事後対策について

令和6年6月6日  
農業技術課  
農業革新支援スタッフ

令和6年6月3、4日に、県内の一部で降雹・強風がありました。地域によっては、作物に損傷が見られていますので、各園の状況を確認し、以下の対策を実施してください。

### <ブドウ（デラウエアを除く）>

(1) 葉や果房の裂傷が見られる園では、病害の発生を防ぐため防除を徹底する。

2回目GA前 オートサイド水和剤80

800倍（収穫30日前まで 3回）

2回目GA後 ホライズンドライフフロアブル

2,500倍（収穫21日前まで 3回）

### <モモ>

(1) 果実や葉に傷がみられる園では、病害の発生を防ぐため防除を徹底する。

インダーフロアブル 5,000倍（収穫30前まで 3回）

オンリーワンフロアブル 2,000倍（収穫前日まで 3回）

(2) 被害程度がはっきりしてから仕上げ摘果、見直し摘果を行う。なお、傷の程度が少なく腐敗につながらない果実は、樹勢調節のため残しておく。

### <ナス>

(1) 倒伏した株は起こし、支柱にしっかり誘引・固定する。また、わき芽かきや下葉の摘葉を遅らせ、葉数を確保して樹勢回復を図る。

(2) 主枝が損傷した場合は切り戻し、強い側枝で代替する。

(3) 損傷した葉・果実は除去し、樹勢回復を図る。

(4) 茎葉の損傷部から病原菌が侵入し、病害が発生しやすいので、適用薬剤による防除を実施するとともに、葉面散布剤により樹勢回復を図る。

### <スイートコーン>

(1) 無理に引き起こすと根を傷めるので、原則そのまま管理する。

(2) 雄穂抽出期後の圃場では、今後の薬剤防除に支障を来す場合には、マイカー線で囲むなどして株を支える。

(3) 収穫時期が近く防除の必要の無い圃場は、そのままにして収穫を迎える。