

山梨県の硬質菌類相に関する研究

大澤正嗣・服部 力¹⁾

Flora of Polypores and Stereoid Fungi in Yamanashi Prefecture

Masashi OHSAWA and Tsutomu HATTORI

Summary: Sixty species of polypores and stereoid fungi were identified in this survey, and twelve of them were discovered for the first time in Yamanashi prefecture. So far, 102 species in total of the fungi have been reported in the prefecture by several researchers.

要旨: 本調査で山梨県内で 60 種の多孔菌類を採集し、同定した。その内、12 種は山梨県新産である。これまでに県内で報告された多孔菌類は 102 種となった。

はじめに

山梨県はその地理的位置と複雑な地形から、常緑広葉樹林帯から夏緑広葉樹林帯、亜高山針葉樹林帯、ハイマツ帯と植生に幅が大きく、また、森林も広く存在（県土の 78 % が森林）し、植物フローラは豊富である。菌類のフローラについても同様に豊富なことは容易に推測されるが、菌類はその種数の多さ、分類・同定の難しさにより、フローラの解明は容易ではなく、多くの情報の蓄積が必要である。そこで筆者は菌類亜門、菌綱のいわゆる硬質菌類を中心に山梨県内の菌類フローラの検討を開始した。

調査及び記載方法

採集は子実体を中心に、主に 1995 年及び 1996 年に行い、同定可能であったものについてリストを作成した。採集品は乾燥標本とし、山梨県森林総合研究所に保管してある。また、本報告では同時に山梨県にて以前に採集、報告された種類を総合したリストの作成を試みた（一部、学名のはっきりしないものは除いてある）。この際、学名（特に属名）は統一の必要性から一部変更した。

記載は筆者らにより採集・同定されたものについては、学名、和名、採集場所、採集年月日、標本番号、それ以前に報告されたものについては、学名、和名、報告者とした。

Echinodontiaceae

Echinodontium tsugicola (P. Henn. & Shirai) Imaz.

J. Jap. Bot. 11 : 517, 1935.

マンネンハリタケ

on a living tree of *Tsuga diversifolia*

Mt. Fuji, Narusawa-mura, Yamanashi

Aug. 20, 1996

YFH10039

山梨県新産

Stereaceae

Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pouzar

Ceska Mykol. 13 : 17, 1959.

ムラサキウロコタケ

中村ら, 1984

Columnocystis abietina (Pers. ex Fr.) Pouzar

Ceska Mykol. 13 : 17, 1959.

マツノウロコタケ

古川ら, 1983

1) 森林総合研究所

Forestry and Forest Products Research Institute

<i>Dendrocorticium roseocarneum</i> (Schwein.) Larsen & Gilbn.Norw. J. Bot. 24 : 115, 1977.	チャウロコタケ on a dead trunk of <i>Quercus serrata</i> Makioka-cho, Yamanashi Nov. 11, 1994 YFH10181
スミレウロコタケ 古川ら, 1983	古川ら, 1983 ; 中村ら, 1984 ; 柴田, 1992
<i>Lopharia cinerascens</i> (Schwein.) Cunningham Trans. Roy. Soc. New Zealand 83 : 622, 1956.	<i>Stereum sanguinolentum</i> (Alb. & Schw. : Fr.) Fr. Eper. Syst. mycol., p.549, 1838.
クシノハシワタケ on a dead branch of <i>Zelkova serrata</i> Mitsue, Wakakusa-cho, Yamanashi Aug. 13, 1996 YFH10102	チウロコタケモドキ on a log of <i>Larix kaempferi</i> Mt.Fuji, Narusawa-mura, Yamanashi Sep., 1995 YFH10183
山梨県新産	古川ら, 1983
<i>Lopharia crassa</i> (Leveille) Boidin Bull. Soc. Mycol. France 74 : 479, 1958.	Corticiaceae
カミウロコタケ on a dead trunk of a broad-leaved tree Makioka-cho, Yamanashi Nov. 15, 1994 YFH10104	<i>Gloeoporus dichrous</i> (Fr.) Bres. Ann. Mycol. 14 : 230, 1916. エビウラタケ on a dead tree of <i>Chamaecyparis obtusa</i> Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi Feb. 5, 1997
山梨県新産	山梨県新産
<i>Stereum gausapatum</i> Fr. : Fr. Hymenomyc. eur., p.638, 1874.	<i>Irpea lacteus</i> (Fr. : Fr.) Fr. Elench. Fung., p.145, 1828. ウスバタケ on a dead trunk of <i>Acer</i> sp. Aokigahara, Ashiwada-mura, Yamanashi Oct. 4, 1996
チウロコタケ on a dead trunk of <i>Quercus serrata</i> Makioka-cho, Yamanashi Nov. 15, 1994 YFH10178	YFH10074
古川ら, 1983 ; 依田, 1965	YFH10091
<i>Stereum hirsutum</i> (Willd. : Fr.) S. F. Gray Nat. arr. Brit. pl.1 : 653, 1821.	山梨県新産
キウロコタケ on a dead trunk of <i>Quercus serrata</i> Makioka-cho, Yamanashi Nov. 11, 1994 YFH10179	<i>Schizopora flavigera</i> (Cke.) Ryv. Mycotaxon 23 : 186, 1985. アナタケ on a log of <i>Quercus serrata</i> Saisyoji, Masuho-cho, Yamanashi Nov. 2, 1996
古川ら, 1983	YFH10170
<i>Stereum ostrea</i> (Bl. & Nees) Fr. Eper. Syst. mycol., p.547, 1838.	古川ら, 1983 ; 中村ら, 1984

Polyporaceae Antrodia albida (Fr.) Donk. Persoonia 4 : 339, 1966. ヒメシロアミタケ 古川ら, 1983	Antrodiella semisupina (Berk. & Curt.) Ryv. Prelim. Polyp. fl. East Africa p.261, 1980. ニカワオシロイタケ 古川ら, 1983
Antrodia heteromorpha (Fr.) Donk. Persoonia 4 : 339, 1966. ミヤマシロアミタケ on a dead trunk of Abies veitchii Odarumi-toge, Makioka-cho, Yamanashi Sep. 1994 YFH10003 古川ら, 1983	Antrodiella zonata (Berk.) Ryv. Bol. Soc. Argent. Bot. 28 : 228, 1992. ニクウスバタケ on a bed-log of Quercus serrata Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi Nov. 16, 1994 YFH10018 古川ら, 1983
Antrodia malicola (Berk. & Curt.) Donk. Persoonia 4 : 340, 1966. ニオイヒメアミタケ on a dead trunk of Prunus sp. Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi Nov. 16, 1994 YFH10004 山梨県新産	Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) Karst. Medd. Soc. Fauna Fl. 5 : 38, 1897. ヤケイロタケ on a dead branch of Quercus serrata Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi Nov. 11, 1994 YFH10011 古川ら, 1983 ; 今関ら, 1959
Antrodia xantha (Fr.) Ryv. Norw. J. Bot. 20 : 8, 1973. チヨークアナタケ on a log Mt. Amari, Nirasaki-shi, Yamanashi Nov. 3, 1996 YFH10005 青島, 1950	Bjerkandera fumosa (Pers. : Fr.) Karst. Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn. 5 : 38, 1879. ヒメモグサタケ on a dead trunk of a broad-leaved tree Pines Park, Fujiyoshida-shi, Yamanashi Dec. 2, 1994 YFH10013 山梨県新産
Antrodiella gypsea (Yasuda) Hattori & Ryv. Mycotaxon L : 35, 1994. シックイタケ on a dead trunk of Chamaeciparis obtusa Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi Nov. 4, 1996 YFH10008 山梨県新産	Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murr. J. Mycol. 9 : 91, 1903. ミダレアミタケ on a dead trunk of Quercus serrata Kushigata-cho, Yamanashi Nov. 3, 1996 YFH10015 山梨県新産
	Cryptoporus volvatus (Peck) Shear. Bull. Torr. Bot. Club, 29 : 450, 1902.

ヒトクチタケ	<i>Datronia mollis</i> (Sommerf. : Fr.) Donk.
柴田, 1992	Persoonia 4 : 338, 1966.
<i>Daedalea dickinsii</i> (Berk. ex cke.) Yasuda	シカタケ
Bot. Mag. Tokyo 36 : 27, 1922.	on a log of <i>Zelkova serrata</i>
ホウロクタケ	Kunari, Nakatomachi, Yamanashi
on a fallen tree of a broad-leaved tree	Feb. 6, 1997
Kuwasaki, Otsuki-shi, Yamanashi	YFH10030
Sep. 6, 1996	山梨県新産
YFH10021	
中村ら, 1984; 柴田, 1992	
<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolt. : Fr.) Schroet.	<i>Fomes fomentarius</i> (L. : Fr.) Kickx.
op.cit. p 493	Flore Crypt. Flandres 2 : 237, 1867.
チャミダレアミタケ	ツリガネタケ
on a dead branch of a broad-leaved tree	on a dead trunk of <i>Fagus crenata</i>
Shishidome, Tsuru-shi, Yamanashi	Mt. Fuji, Narusawa-mura, Yamanashi
Sep. 13, 1996	Sep. 7, 1995
YFH10025	YFH10040
山梨県新産	古川ら, 1983; 今関ら, 1959; 中村ら, 1984; 柴田, 1992
<i>Daedaleopsis purpurea</i> (Cke.) Imaz. & Aosh.	<i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill : Fr.) Bond. et Sing.
The Flora of Eastern Himalaya p.619, 1966.	Ann. Mycol. 39 : 55, 1941.
ミイロアミタケ	エブリコ
on a dead trunk of a broad-leaved tree	今関ら, 1959; 柴田, 1992; 依田, 1965
Aokigahara, Ashiwada-mura, Yamanashi	
Oct. 4, 1996	
YFH10026	
古川ら, 1983	
<i>Daedaleopsis styracina</i> (P. Henn. et Shirai) Imaz.	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) Karst.
Bull. Tokyo Sci. Mus. 6 : 78, 1943.	Ann. Mycol. 39 : 55, 1941.
エゴノキタケ	ツガサルノコシカケ
柴田, 1992; 依田, 1965	on a living tree of <i>Tsuga diversifolia</i>
<i>Daedaleopsis tricolor</i> (Bull. : Fr.) Bond. & Sing.	Aokigahara, Ashiwada-mura, Yamanashi
Ann. Mycol. 39 : 64, 1941.	Oct. 4, 1996
チャカイガラタケ	YFH10048
on a bed-log of <i>Quercus serrata</i>	古川ら, 1983; 今関ら, 1959; 柴田, 1992
Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi	
Nov. 16, 1994	
YFH10036	
古川ら, 1983; 中村ら, 1984; 柴田, 1992	<i>Fomitopsis rosea</i> (Alb. et Schw. : Fr.) Karst.
	Krit. Finl. Basidsv. p.306, 1889.
	パライロサルノコシカケ
	今関ら, 1959
	<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Fr.) Imaz.
	Bull. Tokyo Sci. Mus. 6 : 75, 1943.
	ニオイアミタケ
	中村ら, 1984

<i>Gloeophyllum sepiarium</i> (Fr.) Karst.	on a fallen tree of <i>Abies veitchii</i>
Finl. Hattsv. 2 : 80, 1879.	Aokigahara, Ashiwada-mura, Yamanashi
キカイガラタケ	Oct. 4, 1996
on a dead trunk of <i>Pinus densiflora</i>	YFH10092
Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi	古川ら, 1983; 今関ら, 1959; 柴田, 1992
Dec. 1, 1994	
YFH10064	
柴田, 1992	
<i>Gloeophyllum trabeum</i> (Fr.) Murr.	<i>Junghuhnia nitida</i> (Fr.) Ryv.
N. Am. Fl. 9 : 129, 1908.	Persoonia 7 : 18, 1972.
キチリメンタケ	ニクイロアナタケ
on a log of a coniferous tree	on a dead trunk of a broad-leaved tree
Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi	Aokigahara, Ashiwada-mura, Yamanashi
Nov. 4, 1996	Oct. 4, 1996
YFH10073	YFH10094
古川ら, 1983	山梨県新産
<i>Grifola frondosa</i> (Dicks. : Fr.) S. F. Gray	<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull. : Fr.) Murr.
Nat. Arr. Brit. Pl. 1 : 643, 1821.	Mycologia 12 : 11, 1920.
マイタケ	マスタケ
柴田, 1992; 依田, 1965	on a fallen tree of <i>Tsuga diversifolia</i>
	Mt.Fuji, Narusawa-mura, Yamanashi
	Sep. 7, 1995
	YFH10095
	今関ら, 1959; 中村ら, 1984; 柴田, 1992
<i>Heterobasidion insulare</i> (Murr.) Ryv.	
レンガタケ	<i>Lenzites betulina</i> (Fr.) Fr.
on a fallen tree of <i>Abies veitchii</i>	Epicr. p.405, 1838.
Aokigahara, Ashiwada-mura, Yamanashi	カイガラタケ
Oct. 4, 1996	on a dead trunk of a broad-leaved tree
YFH10075	Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi
古川ら, 1983; 中村ら, 1984; 依田, 1965	Nov. 4, 1996
	YFH10098
	古川ら, 1983; 今関ら, 1959; 中村ら, 1984; 柴田, 1992; 依田, 1965
<i>Hydnochaete tabacinoides</i> (Yas.) Imazeki,	
Bull. Tokyo Sci. Mus. 6 : 103, 1943	<i>Leptoporus mollis</i> (Pers. : Fr.) Pil.
コガネウスバタケ	Atl. Champ. Eur. 3 : 174, 1936.
on a dead trunk of a broad-leaved tree	オオシミタケ
Aokigahara, Ashiwada-mura, Yamanashi	今関ら, 1959
Oct. 4, 1996	
YFH10077	
山梨県新産	
<i>Ischnoderma resinosum</i> (Fr.) Karst.	<i>Loweoporos roseo-albus</i> (Jungh.) Ryv.
Soc. Fauna Fl. Fenn. 5 : 38, 1879.	Prelim. Polyp. fl. East Africa p.415, 1980.
ヤニタケ	ホウネンタケ
	on a dead trunk of <i>Quercus serrata</i>

Kushigata-cho, Yamanashi Nov. 3, 1996 YFH10106 山梨県新産	<i>Oxyporus cuneatus</i> (Murr.) Aoshi. Trans. Mycol. Soc. Japan 8 : 3, 1967. ヒメシロカイメンタケ on a dead trunk of a young Chamaecyparis obtusa Makioka-cho, Yamanashi
Melanoporia castanea (Imaz.) Hattori & Ryv. Mycotaxon L : 29, 1994. クロサルノコシカケ 中村ら, 1984 ; 柴田, 1992	Nov. 11, 1994 YFH10115 山梨県新産
<i>Microporus vernicipes</i> (Berk.) O. Kuntze Rev. gen. pl. 3 : 494, 1898. ツヤウチワタケ on a dead branch of a broad-leaved tree Aokigahara, Ashiwada-mura, Yamanashi Oct. 4, 1996 YFH10109 中村ら, 1984	<i>Perenniporia fraxinea</i> (Bull. : Fr.) Ryv. Polyp. N. Europe, p.307, 1978. ベッコウタケ on a butt of living Robinia pseudoacacia Kamiyoshida, Fujiyosida-shi, Yamanashi Sep. 7, 1995 YFH10046 柴田, 1992 ; 依田, 1965
<i>Oligoporus balsameus</i> (Pk.) Gilbn. & Ryv. Mycotaxon 22 : 364, 1985. レンゲタケ on a living tree of Larix kaempferi Mt.Fuji, Narusawa-mura, Yamanashi Aug. 1, 1994 YFH10113 古川ら, 1983 ; 柴田, 1992	<i>Perenniporia medulla-panis</i> (Jacq. : Fr.) Donk. Persoonia 5 : 76, 1967. ウスキアナタケ on a dead trunk of a broad-leaved tree Aokigahara, Ashiwada-mura, Yamanashi Oct. 4, 1996 YFH10118 山梨県新産
<i>Oligoporus caesius</i> (Schrad. : Fr.) Gilbn. & Ryv. Mycotaxon 22 : 365, 1985. アオゾメタケ 古川ら, 1983 ; 今関ら, 1959	<i>Perenniporia ochroleuca</i> (Berk.) Pilat. Nor. J. Bot. 19 : 233, 1972. ウズラタケ on a dead part of living Prunus persica Kushigata-cho, Yamanashi Jul. 31, 1993 YFH10223 山梨県新産
<i>Oligoporus fragilis</i> (Fr.) Gilbn. & Ryv. Mycotaxon 22 : 365, 1985. シミタケ 古川ら, 1983	<i>Perenniporia subacida</i> (Pk.) Donk. Persoonia 5 : 76, 1967. キンイロアナタケ on a fallen tree of Tsuga diversifolia Mt.Fuji, Narusawa-mura, Yamanashi Oct. 9, 1994 YFH10121
<i>Oligoporus guttulatus</i> (Pk.) Gilbn. & Ryv. Mycotaxon 22 : 365, 1985. シミガタセンペイタケ 古川ら, 1983	

古川ら, 1983	<i>Polyporus squamosus</i> Huds. : Fr. Syst. Mycol. 1 : 343, 1821.
<i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat. Ess. Taxon. Hym., p.86. 1900.	アミヒラタケ 柴田, 1992
カイメンタケ on a stump of <i>Larix kaempferi</i> Masutomi, Sutama-cho, Yamanashi Jun. 17. 1996 YFH10129	<i>Polyporus varius</i> Fr. Syst. Mycol. 1 : 352, 1821. キアシグロタケ 古川ら, 1983; 柴田, 1992
古川ら, 1983; 今関ら, 1959; 中村ら, 1984; 柴田, 1992	<i>Porodisculus pendulus</i> (Schw.) Murr. N. Am. Flora. 9 : 47, 1907. ヌルデタケ 柴田, 1992
<i>Piptoporus betulinus</i> (Bull. : Fr.) Karst. Medd. Soc. Fauna Fl. Fenn. 6 : 9, 1881.	<i>Protodaedalea hispida</i> Imaz. Rev. Mycol. 20 : 159, 1955. ムカシオオミダレタケ 古川ら, 1983
カンバタケ on a dead trunk of <i>Betula davurica</i> Okusenjo, Kofu-shi, Yamanashi Oct. 16, 1995 YFH10148 柴田, 1992	<i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq. : Fr.) Karst. Rev. Mycol. 3 : 18, 1881. シュタケ 今関ら, 1959
<i>Piptoporus soloniensis</i> (Dub. : Fr.) Pil. Atl. Champ. Europe 2 : 126, 1937.	<i>Pycnoporus coccineus</i> (Fr.) Bond. & Sing. ヒイロタケ on a log of <i>Abies firma</i> Makioka-cho, Yamanashi Nov. 11, 1994 YFH10225
シロカイメンタケ on a stump of a broad-leaved tree Kuwasaki, Otsuki-shi, Yamanashi Sep. 6, 1996 古川ら, 1983; 中村ら, 1984; 柴田, 1992	今関ら, 1959; 依田, 1965
<i>Polyporus badius</i> (Pers. : S. F. Gray) Schw. Trans. Am. Phil. Soc. II 4 : 155, 1832.	<i>Skeletocutis nivea</i> (Jungh.) Keller. Persoonia 10 : 353, 1979.
アシグロタケ 古川ら, 1983; 今関ら, 1959; 柴田, 1992	ヒメカタパンタケ 古川ら, 1983
<i>Polyporus arcularis</i> Batsch. : Fr. Syst. Mycol. 1 : 342, 1821.	<i>Trametes conchifer</i> (Schw. : Fr.) Pil. Atlas Champ. Eur. 3 : 264, 1939.
アミスキタケ 中村ら, 1984; 柴田, 1992	サカズキカワラタケ 中村ら, 1984
<i>Polyporus brumalis</i> Pers. : Fr. Syst. Mycol. 1 : 348, 1821.	
オツネンタケモドキ 古川ら, 1983; 柴田, 1992	

Trametes gibbosa (Pers : Fr.) Fr.

Epicr. Myc. 492, 1838

オオチリメンタケ

今関ら, 1959

Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi

Nov. 16, 1994

YFH10211

山梨県新産

Trametes hirsuta (Wulf. : Fr.) Pil.

Atl. Champ. Europe 3 : 265, 1939.

アラゲカワラタケ

on a dead branch of Quercus serrata

Hakushu-cho, Yamanashi

Nov. 1, 1994

YFH10195

古川ら, 1983; 今関ら, 1959; 中村ら, 1984; 柴田, 1992;

依田, 1965

Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryv.

Norw. J. Bot. 19 : 237, 1972.

シハイタケ

on a dead trunk of Pinus densiflora

Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi

Nov. 16, 1994

YFH10213

今関ら, 1959

Trametes lactinea (Berk.) Pat.

Essai Tax. p.92, 1900.

クジラタケ

on a log of a broad-leaved tree

Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi

Nov. 4, 1996

YFH10201

柴田, 1992; 依田, 1965

Trichaptum biforme (Fr.) Ryv.

Norw. J. Bot. 19 : 237, 1972.

ハカワラタケ

on a living tree of Prunus salicina

Kushigata-cho, Yamanashi

Nov. 3, 1996

YFH10217

山梨県新産

Trametes pubescens (Schum : Fr.) Pilat

Atl. Champ. Europ. 3 : 268, 1939.

ヤキフタケ

古川ら, 1983; 中村ら, 1984

Trichaptum fusco-violaceum (Fr.) Ryv.

Norw. J. Bot. 19 : 237, 1972.

ウスバシハイタケ

on a dead trunk of Tsuga diversifolia

Hakushu-cho, Yamanashi

Nov. 1, 1994

YFH10220

古川ら, 1983; 今関ら, 1959; 中村ら, 1984

Trametes versicolor (L. : Fr.) Pilat.

Atl. Champ. Europ. 3 : 261, 1939.

カワラタケ

on a dead trunk of Quercus serrata

Saishoji, Masuho-cho, Yamanashi

Nov. 11, 1994

YFH10019

古川ら, 1983; 今関ら, 1959; 中村ら, 1984; 柴田, 1992;

依田, 1965

Tyromyces albellus (Fr.) Karst.

古川ら, 1983

(名称要検討)

Trametes villosa (Fr.) Kreisel

Ciencias Biol. Ser. 4, no 16 : 84, 1971.

フルイカワラタケ

on a dead trunk of Prunus sp.

Tyromyces subochrotinctus Aoshima

ビスケットタケ

古川ら, 1983

(名称要検討)

Hymenochaetaceae <i>Coltricia cinnamomea</i> (Fr.) Murr. Bull. Torr. Bot. Cl. 31 : 343, 1904. ニッケイタケ 古川ら, 1983; 今関ら, 1959	<i>on a butt of a living Larix kaempferi</i> <i>Mt. Fuji, Narusawa-mura, Yamanashi</i> <i>Oct. 5, 1995</i> <i>YFH10089</i> <i>古川ら, 1983</i>
<i>Hymenochaete intricata</i> Lloyd. Myc., Writ., VII : 1157, 1922. ミヤベオウロコタケ 今関ら, 1959	<i>Phellinus chrysoloma</i> (Fr.) Donk. <i>Proc. K. Ned. Akad. Wet. (C) 74 : 39, 1971.</i> <i>マツノカタワタケ</i> <i>on a living tree of Larix kaempferi</i> <i>Mt. Fuji, Narusawa-mura, Yamanashi</i> <i>Sep. 15, 1993</i> <i>YFH10132</i> <i>古川ら, 1983; 柴田, 1992</i>
<i>Hymenochaete rubiginosa</i> (Dicks. : Fr.) Lev. Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3. 5 : 151, 1846. エビウロコタケ on a dead branch of Quercus crispula Okusenjyo, Kofu-shi, Yamanashi Oct. 11, 1995 <i>YFH10082</i> 山梨県新産	<i>Phellinus gilvus</i> (Schw.) Pat. <i>Ess. Tax. Hym., p.97, 1900.</i> <i>ネンドタケ</i> <i>古川ら, 1983</i>
<i>Inonotus mikadoi</i> (Lloyd) Bond. Color. III. Mush. Japan II. 187. pl.128, f.848, 1989 カワウソタケ on a dead trunk of Prunus sp. Yamadera, Kushigata-cho, Yamanashi Nov. 3, 1996 <i>YFH10087</i> 柴田, 1992	<i>Phellinus hartigii</i> (Allesch. & Schnabl) Bond. <i>Polyp. Eur. USSR and Caucasia, p. 365, 1953.</i> <i>モミサルノコシカケ</i> <i>on a dead trunk of Tsuga diversifolia</i> <i>Mt. Fuji, Narusawa-mura, Yamanashi</i> <i>Aug. 2, 1994</i> <i>YFH10137</i> <i>古川ら, 1983; 依田, 1965</i>
<i>Inonotus scaura</i> (Lloyd) Hattori Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser. B, 21 : 103, 1995. サジタケ 古川ら, 1983	<i>Phellinus igniarius</i> (L. : Fr.) Quel. <i>Ench. Fung., p.172, 1886.</i> <i>キコブタケ</i> <i>今関ら, 1959; 柴田, 1992</i>
<i>Inonotus sciurinus</i> Imaz. Bull. Tokyo Sci. Mus. 6 : 106, 1943. ラッコタケ 依田, 1965	<i>Phellinus linteus</i> (Berk. & Curt.) Teng. <i>Funji of China, p.467, 1964.</i> <i>メシマコブ</i> <i>依田, 1965</i>
<i>Inonotus tomentosus</i> (Fr.) Teng Fungi of China p.763, 1964. ニセカイメンタケ	<i>Phellinus ionicerinus</i> (Bond.) Pilat in Kavina et Pilat <i>Atlas Hub Europskych, 3 : 535, 1936-1942.</i> <i>ウツギノサルノコシカケ</i> <i>古川ら, 1983; 今関ら, 1959; 中村ら, 1984</i>

Phellinus pini (Fr.) Murr.
Ann. Mycol. 11 : 246, 1913.
エゾサルノコシカケ
on a dead trunk of *Picea jezoensis* var. *hondoensis*
Odarumi-toge, Makioka-cho, Yamanashi
Aug. 1994
YFH10141
山梨県新産

Phellinus pomaceus (Pers. : S. F. Gray) Maire,
Fungi Catal. I . p. 37, 1932.
サクラサルノコシカケ
on a dead trunk of *Prunus* sp.
Mt.Fuji, Narusawa-mura, Yamanashi
Sep. 12, 1995
YFH10142
古川ら, 1983

Phellinus prunicola (Murr.) Gilbn.
Mycotaxon 9 : 73, 1979.
チャサクラアナタケ
青島, 1950

Phellinus xeranticus (Berk.) Pegler
Kew Bull. 21 : 44, 1967.
ダイダイタケ
on a stump of *Quercus serrata*
Hakusyu-cho, Yamanashi
Nov. 1, 1994
YFH10145
柴田, 1992

Ganodermataceae

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
Soc. Mycol. France Bull. 5 : 67, 1889.
コフキサルノコシカケ
on a dead trunk of *Prunus persica*
Yamadera, Kushigata-cho, Yamanashi
Oct. 4, 1996
YFH10055
柴田, 1992

Ganoderma lucidum (W. Curt. : Fr.) Karst.
Rev. Mycol. 3 (9) : 17, 1881.
マンネンタケ
on a living tree of *Prunus persica*
Yamadera, Kushigata-cho, Yamanashi
Nov. 3, 1996
YFH10058
柴田, 1992; 依田, 1965

Ganoderma neo-japonicum Imaz.
Bull. Tokyo Sci. Mus. 1 : 37, 1939.
マゴジャクシ
依田, 1965

Ganoderma tsugae Murr.
Torrey Bot. Club Bull. 29 : 601, 1902.
ツガノマンネンタケ
on a fallen tree of *Tsuga diversifolia*
Mt.Fuji, Narusawa-mura, Yamanashi
Sep. 12, 1995
YFH10059
山梨県新産

結果と考察

富士山（山梨県側）は、しばしば日本菌学会やユーロ国際大会の菌類採集会開催地となり、その時多くの菌類が採集、報告されている（古川ら, 1983、今関ら, 1959、中村ら, 1984）。また、柴田（1992）、依田（1965）による報告もあり、他県と比較すると比較的フロラの解明が進んでいると思われる。

この中で、今回の調査により、60種を記録し、報告した。山梨県新産は12種である。今までの報告を総合すると、山梨県には102種の硬質菌類が認められている。しかし、硬質菌類の山梨県での種数は、今後増えることは確実であり、更に報告を続けていきたい。

今回のリストに載せられている種の多くは、日本に広く分布していると考えられている。しかし、日本各地域の菌類フロラはまだ十分調査されていないのが現状であり、貴重種や、分布に特徴のある種が存在したとしても、それを明らかにすることは難しい。今後、山梨県におけるフロラを完成し、菌類分布の解明に資すると同時に、県内のミクロ的な分布について考察できればと考えている。

今回報告した菌類の中には、針葉樹の腐朽病菌として、*Antrodia heteromorpha*, *Antrodia xantha*, *Echinodontium tsugicola*, *Fomitopsis officinalis*, *Fomitopsis pinicola*, *Ganoderma applanatum*, *Ganoderma tsugae*, *Gloeophyllum odoratum*, *Gloeophyllum sepiarium*, *Gloeophyllum trabeum*, *Heterobasidion insulare*, *Inonotus tomentosa*, *Laetiporus sulphureus*, *Lenzites betulinus*, *Columnocystis abietina*, *Oxyporus balsameus*, *Perenniporia subacida*, *Phellinus chrysoloma*, *Phellinus hartigii*, *Phellinus pini*, *Phaeolus schweinitzii*, *Pycnoporus coccineus*, *Stereum sanguinolentum*, *Trametes hirsutus*, *Trametes versicolor*, *Trichaptam abietimus*、また、広葉樹の腐朽病菌として *Antrodia heteromorpha*, *Fomes fomentarius*, *Fomitopsis pinicola*, *Daedalea dickinsii*, *Daedaleopsis tricolor*, *Ganoderma applanatum*, *Inonotus mikadoi*, *Laetiporus sulphureus*, *Lenzites betulinus*, *Perenniporia fraxinea*, *Piptoporus betulinus*, *Pycnoporus cinnabarinus*, *Pycnoporus coccineus*, *Stereum hirsutum* *Trametes hirsuta*, *Trametes gibbosa*, *Trametes versicolor* が含まれている。今後、これらの菌類による樹木への被害等についても把握していきたい。

