


大風に対する農作物の事前・事後対策

令和5年9月5日
農業技術課

5日9時の観測によると、熱帯低気圧が日本の南にあって、今後24時間以内に台風となる見込みです。この熱帯低気圧の中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルとなっています。

最新の台風情報を確認し事前対策を徹底するとともに、被害が発生した場合は、安全を確認した上で速やかに事後対策を実施して下さい。



出展 気象庁台風経路図 9月5日10時20分現在

○共通事項

- ① 気象情報に注意し、事前対策を早めに実施する。台風が接近した場合には、強風等による人的被害の危険性が高まるので、大雨や強風が治まるまでは、見回り等は行わない。また、雨が止んだ後でも増水した水路その他、危険な場所には近づかないなど安全には十分注意し、転落、滑落事故に遭わないように慎重を期す。
- ② ハウス等については、強風に備え、金具等の緩みなどの点検、補修を行い、マイカ線などによる被覆資材の固定、妻面の補強など、暴風対策を実施するとともに、飛来物による損傷を防止するため、周辺で強風によって飛ばされる恐れのあるものは、あらかじめ片付けておく。また、農機具庫や作業小屋等についても必要な補修や強風対策を行う。
- ③ 収穫期を迎えた農作物については、集出荷施設等の指示に従って収穫を行うが、未熟なものは収穫しない。

○果樹

〔事前対策〕

- ①冠水、滯水の恐れのあるほ場では、排水溝を設置するとともに、排水路の点検、補修、整備を行う。
- ②傾斜地では、樹冠下の土壤流亡を防ぐため、敷ワラや敷草を行う。
- ③収穫が終わったほ場では、シルバーマルチ等は回収する。収穫前のほ場では、強風によりマルチが飛ばされないようにマルチ押さえを補強しておく。

<棚栽培果樹>

- ①強風による棚の揺れや倒壊を防ぐため、つか杭を追加設置するとともに、収穫の終わった園では防鳥網を取り外すか、縛ってまとめておく。また、棚の点検も行い傷んだ部分は補強する。特に、隅柱や周囲柱の控え線の緩み等は修繕しておく。
- ②収穫前及び収穫中のブドウでは、大雨による裂果を防ぐため排水対策を徹底する。
- ③簡易雨除けで被覆中のほ場では、強風でビニールが飛ばされないように、補強を行う。

<立木果樹>

- ①倒伏や主幹部の損傷を防止するため、支柱などで固定する。帆柱が設置してあるモモ園等では針金を点検し補修する。
- ②カキ、リンゴなどの果実がある園では、枝揺れによる傷や落果を防ぐため、風の当たりやすい枝を中心に支柱などにより固定する。
- ③モモせん孔細菌病の秋季防除として、風雨の前に防除を実施する（2週間間隔）。
(台風前に防除が出来なかった場合は、天候回復後直ちに防除を行う)

<施設果樹>

- ①施設栽培では、棚やパイプ等の骨材の点検を行い、必要に応じて補修や補強を行う。サイド等のビニールが、強風でまくられないようにマイカ線等の点検を徹底する。
- ②ブドウの雨除けハウスでは、施設の倒壊を防ぐため、風が強くなる前にビニールを巻き上げる。

〔事後対策〕

- ①園地が滯水した場合は、速やかに排水対策を行う。また、傾斜地で根元の土壤が流失した場合は、土寄せを行う。
- ②樹が倒伏した場合は、台風通過後直ちに、根を切らないように樹を起こし、根元に土を寄せ支柱等で固定する。
- ③太枝が裂けた場合は、裂傷部をビニールで覆い、縄等で結束する。なお、裂傷がひどい場合は、裂傷部を平らに剪除し、ゆ合剤を塗布する。
- ④ブドウでは、カサの外れ等の見直しを行う。葉ズレ、カサズレ、打撲のひどい果粒は摘粒する。また、晩腐病の二次感染や裂果からの腐敗を防ぐため、ほ場を巡回し発病果粒や裂果した果粒は速やかに摘粒し、園外へ持ち出すか土中に埋める。
- ⑤落果した果実は、病害の伝染源となるため、速やかに園外へ持ち出すか、土中に埋める。
- ⑥ほ場を見回り、果実腐敗病が発生している場合には、速やかに除去する。
- ⑦強風や雨により、枝葉や果実等への損傷や泥のはね上がりなどから、病害の発生が心配されるため、防除暦等にしたがった薬剤防除を行う。また、収穫後のほ場においても、防除暦に従い薬剤防除を徹底する。
- ⑧施設栽培では、棚やハウスの骨材、ビニール、各種の装置、機具、機械等を点検し、破損のある場合は修理する。

○野 菜

〔事前対策〕

- ①ほ場周辺の排水路を点検、補修、整備し、排水路からの逆流防止のため、ゴミ等を取り除く。また、ほ場内には、排水溝を設ける。
- ②風の強く当たる地域では、ほ場周辺に防風ネットを設置する。
- ③ハウスや雨除け施設などの支柱や基礎などを点検、補強するとともに、ビニールがまくられないようにマイカ線等を点検し施設の被害防止に努める。
- ④強風による飛しよう物で、ハウスなどの施設が損傷を受けないように、周辺の清掃や防風ネットを設置する。
- ⑤ナス、トマト、キュウリ等は、倒伏を防ぐため、支柱の補強、固定、誘引等を行う。
- ⑥収穫期を迎えている果実は、台風情報に注意し、必要に応じ速やかに収穫する。
- ⑦スイートコーンは、受粉期以降から収穫前のステージでは雄穂を切除して草丈を低くするトッピング処理を行うことにより、倒伏軽減効果が得られる。
- ⑧キャベツは、9～10月頃の気温が低い時期に特に黒腐病が発生しやすい。降雨が予想される場合、予防のため銅剤等を散布する。また、害虫の食害根も病原菌の侵入口となるため害虫防除も徹底する。スイートコーンは、受粉期以降から収穫前のステージでは雄穂を切除して草丈を低くするトッピング処理を行うことにより、倒伏軽減効果が得られる。

〔事後対策〕

- ①滯水しているほ場は、速やかに排水を行う。
- ②茎葉の損傷や泥のはね上がり、汚水の浸入等により、疫病、菌核病など病害の発生が懸念されるため、防除基準に従って薬剤を散布し、病害の発生を予防する。
- ③ナス、キュウリ、トマト等は、キズ果を早めに除去し、樹の負担の軽減を図る。
- ④倒伏したものは速やかに引き起こす。この際、根を切らないように注意する。ただし、スイートコーンは、無理に引き起こすと根を傷めるので、原則そのまま管理する。
- ⑤スイートコーンは、すす紋病の発生・拡大が懸念されるので薬剤散布を行う。また、追肥を行い樹勢を低下させないよう努める。
- ⑥キャベツは引き続き予防として銅剤等を散布する。すでに発病が認められている圃場では、治療効果のある抗生物質剤等を含む薬剤を散布する。

○花き

〔事前対策〕

- ①野菜の事前対策①～④に準拠して、被害防止に努める。
- ②露地切り花は、フラワーネットや支柱などの点検・補強を行い倒伏防止に努める。
- ③鉢花の露地ベンチ栽培では、ベンチに固定できる鉢利用（C鋼鉢）や穴あきトレーを利用するなど倒伏防止に努める。

〔事後対策〕

- ①滯水しているほ場は、速やかに排水を行う。
- ②露地切り花が倒伏した場合は根を切らぬように引き起こす。
- ③茎葉の損傷により、ベト病やうどんこ病、灰色かび病など病害の発生が懸念されるため、防除基準に従い予防散布を徹底する。

○水 稲

〔事前対策〕

- ①浸水・冠水害を防止するため、排水路の点検、補修、ゴミの除去を行う。

- ②事前に水口、排水口をふさぎ、水の流入を防ぐ。
- ③収穫までに期間のあるものについては、水を深めに張り、株元を保護する。

〔事後対策〕

- ①浸水や冠水した水田では、早急に排水に努め、新鮮な水を灌漑する。
- ②収穫までに期間のあるもので、倒伏した場合は、数株ごとに引き起こして結束する。
- ③収穫時期に達しているものについては、排水に努め、早めに収穫を行う。
- ④稻架が倒伏した場合は、早めに引き起こし、乾燥に努める。

○大 豆

〔事前対策〕

- ①ほ場周囲に排水溝を設置する。
- ②滯水しやすい部分には、あらかじめ溝切りをする。

〔事後対策〕

- ①滯水しているほ場は、速やかに排水を行う。

○畜 産

〔事前対策〕

- ①畜舎関連施設については、損傷、倒壊等を避けるため早めの点検を行い必要に応じて補修を行う。
- ②畜舎関連施設への浸水の恐れがある場合、溝を掘るなどして排水に努める。また、畜舎への浸水等による家畜への被害に備え、事前に避難場所の確認などを行う。
- ③停電や断水等への対応を確認し、必要に応じて発電機等の手配をするとともに、搾乳作業やバルククーラーの冷却に支障のないよう万全を期す。

〔事後対策〕

- ①飼料作物
 - ・冠水や浸水等の被害を受けたほ場においては、速やかな排水に努める。
 - ・飼料用トウモロコシの倒伏及び茎の折損等が著しく回復が期待できない場合は、青刈り利用またはサイレージ調製を行う。
 - ・サイレージ調製時には、乳酸菌等添加剤を利用し安定した発酵促進を図るとともに、利用の際は、飼料分析を実施しサイレージの発酵品質等の確認を行ってから家畜に給与する。
- ②家畜
 - ・個体観察の徹底、疾病の早期発見と蔓延防止に努める。
 - ・冠水等によって変質した飼料は廃棄し、飼料タンク内の点検や飼料庫の通風を促す。
- ③畜舎
 - ・天候が回復した後、直ちに畜産施設内及びその周辺の排水を行う。
 - ・堆肥舎、牛舎から流出した堆肥や家畜ふんは、速やかに回収し消石灰等散布を行い、悪臭等の発生抑制に努める。
 - ・雨水等の流入により濡れた敷料は除去し、乾燥した敷料に交換する。
 - ・畜舎内外の消毒を徹底し、疾病等の未然防止に努める。