

Warning

# 宮崎県で 高病原性鳥インフルエンザの 疑似患畜を確認！(家きん5例目)

発生地域  
拡大

～令和7年シーズンも防疫意識を高く、気を引き締めて～

**自己点検の実施・報告と  
不備があれば早急に対応をお願いします！**

**【概要】農場から通報、簡易検査及び遺伝子検査で陽性**

・11月22日 宮崎県日向市 肉用鶏飼養農場 約 4.8 万羽

**【野鳥における事例も増加】**

・陽性確認：1道7県35例（野鳥30例、環境試料5例）

北海道・宮崎県・山形県・鹿児島県・新潟県・福岡県・群馬県・福島県で陽性事例確認

**飼養衛生管理の基本的な管理項目を毎月点検・改善しましょう！****▶人、物、車両の入出時対策**

- ・衛生管理区域専用の衣服や靴の使用
- ・着用の前後で交差のない動線、および明確な境界を確保
- ・適切な車両消毒、手指消毒の実施
- ・家きん舎ごとの専用の靴の使用
- ・侵入防止対策を出入りする関係者へ周知徹底

**▶野生動物の侵入防止、誘引防止**

- ・畜舎の壁、防鳥ネット等の破損修繕  
→特にカラス、イタチ等の侵入防止を！
- ・鶏卵・鶏糞の搬出口に覆いを設置
- ・たい肥舎への防鳥ネット設置
- ・餌置場の清掃、死体や廃棄卵の適切な処理など誘引を防止
- ・隠れ場所を作らない（整理整頓・草刈り）

**<高病原性鳥インフルエンザの症状>**

- |              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| ・肉冠や肉垂が紫色になる | ・出血、壊死    | ・顔面の腫れ、むくみ |
| ・産卵低下または停止   | ・神経症状、下痢等 | ・高い死亡率     |

**少しでも異常を感じたら早期通報をお願いします！**鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：<http://www.maff.go.jp/j/syuan/douei/tori/index.html>

Warning

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728  
夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018