

Warning

鳥取県で
高病原性鳥インフルエンザの
疑似患畜を確認！（家きん6例目）

発生地域
拡大！

～「いつもと違う目線」も大切！再度農場内の確認をしましょう！～
**自己点検の実施・報告と
不備があれば早急に対応をお願いします！**

- 【概要】農場から通報、簡易検査及び遺伝子検査で陽性
・12月2日 鳥取県米子市 肉用鶏飼養農場 約 7.5 万羽
- 【野鳥における事例も増加】
・陽性確認：1道7県45例（野鳥39例、環境試料6例）
北海道・宮城県・山形県・鹿児島県・新潟県・福岡県・群馬県・福島県で陽性事例確認

飼養衛生管理の基本的な管理項目を毎月点検・改善しましょう！

人、物、車両の入出時対策

衛生管理区域専用の衣服や靴の使用
着用で交差のない動線、および明確な境界を確保
適切な車両消毒、手指消毒の実施
家きん舎ごとの専用の靴の使用
侵入防止対策を出入りする関係者へ周知徹底

野生動物の侵入防止、誘引防止

畜舎の壁、防鳥ネット等の破損修繕
→特にカラス、イタチ等の侵入防止を！
鶏卵・鶏糞の搬出口に覆いを設置
たい肥舎への防鳥ネット設置
餌置場の清掃、死体や廃棄卵の適切な処理など誘引を防止
隠れ場所を作らない（整理整頓・草刈り）

自己防衛

<高病原性鳥インフルエンザの症状>

肉冠や肉垂が紫色になる
産卵低下または停止

出血、壊死
神経症状、下痢等

顔面の腫れ、むくみ
高い死亡率

少しでも異常を感じたら早期通報をお願いします！

発見通報


鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト: <http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

Warning

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで
電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728
夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018

予防対策の重要ポイント

【衛生管理区域】



①人・物・車両によるウイルスの持込み防止

- ・衛生管理区域、家きん舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底
- ・衛生管理区域専用の衣服、靴、家きん舎ごとの専用の靴の使用
- ・上記措置の記録

②野生動物対策

- ・防鳥ネットの設置・修繕、壁の破損・隙間の修繕
- ・家きん舎周囲の清掃、整理・整頓
- ・上記措置の定期点検

周辺に水辺のある農場は

①、②の予防対策を徹底

リスクを減らす取組(季節を限って水を抜く、野鳥を寄せ付けないよう忌避テープを張るなど)が効果的