

Warning

姫路

で続発!!

# 兵庫県で 高病原性鳥インフルエンザの 疑似患畜を確認！(家きん14例目)

【概要】農場から通報、簡易検査及び遺伝子検査で陽性

・1月8日 兵庫県姫路市 採卵鶏飼養農場 約 15.5 万羽

【野鳥における事例も増加】

・陽性確認: 1道10県64例(野鳥53例、環境試料11例)

北海道・宮崎県・山形県・鹿児島県・新潟県・福岡県・群馬県・福島県・大分県・高知県・徳島県で陽性事例確認

**発生のトップシーズンです!!**  
自己点検の実施と毎月の報告、  
不備があれば早急な対応をお願いします。

飼養衛生管理の基本的な管理項目を**毎月点検・改善**しましょう！

## 人、物、車両の入出時対策

- ・衛生管理区域専用の衣服や靴の使用
- ・着用の前後で交差のない動線、および明確な境界を確保
- ・適切な車両消毒、手指消毒の実施
- ・家きん舎ごとの専用の靴の使用
- ・侵入防止対策を出入りする関係者へ周知徹底

## 野生動物の侵入防止、誘引防止

- ・畜舎の壁、防鳥ネット等の破損修繕  
→特にカラス、イタチ等の侵入防止を！
- ・鶏卵・鶏糞の搬出口に覆いを設置
- ・たい肥舎への防鳥ネット設置
- ・餌置場の清掃、死体や廃棄卵の適切な処理など誘引を防止
- ・隠れ場所を作らない(整理整頓・草刈り)



## ＜高病原性鳥インフルエンザの症状＞

- |              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| ・肉冠や肉垂が紫色になる | ・出血、壊死    | ・顔面の腫れ、むくみ |
| ・産卵低下または停止   | ・神経症状、下痢等 | ・高い死亡率     |

**少しでも異常を感じたら早期通報をお願いします！**



鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト: <http://www.maff.go.jp/j/syounan/douei/tori/index.html>

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728  
夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018

Warning


## 令和7年シーズンの発生状況

これまでに14事例406万羽が殺処分の対象に

※ 疑似患畜確認時の羽数

地域	疑似患畜判定日	用途	羽数（約）	亜種
1 北海道白老町	10/22	採卵鶏	45.9万羽	H5N1
2 北海道恵庭市	11/2	採卵鶏	23.6万羽	H5N1
3 新潟県胎内市	11/4	採卵鶏	63万羽	H5N1
4 新潟県胎内市	11/9	採卵鶏	28万羽	H5N1
5 宮崎県日向市	11/22	肉用鶏	4.8万羽	H5N1
6 鳥取県米子市	12/2	肉用鶏	7.5万羽	H5N1
7 兵庫県姫路市	12/16	採卵鶏	24万羽	H5N1
8 岡山県津山市	12/20	採卵鶏	43万羽	H5N1
9 京都府亀岡市	12/24	採卵鶏	28万羽	H5
10 茨城県城里町	12/25	採卵鶏	97万羽	H5
11 北海道由仁町	12/29	採卵鶏	0.6万羽	H5
12 埼玉県嵐山町	12/30	採卵鶏	24万羽	H5
13 宮崎県延岡市	1/2	肉用鶏	0.6万羽	H5
14 <b>兵庫県姫路市</b>	<b>1/8</b>	<b>採卵鶏</b>	<b>15.5万羽</b>	<b>H5</b>

## 予防対策の重要なポイント



- ①人・物・車両によるウイルスの持込み防止

  - ・衛生管理区域、家きん舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底
  - ・衛生管理区域専用の衣服、靴、家きん舎ごとの専用の靴の使用
  - ・上記措置の記録

- ②野生動物対策

  - ・防鳥ネットの設置・修繕、壁の破損・隙間の修繕
  - ・家きん舎周囲の清掃、整理・整頓
  - ・上記措置の定期点検

周辺に水辺のある農場は  
①、②の予防対策を徹底

リスクを減らす取組(季節を限って水を抜く、野鳥を寄せ付けないよう忌避テープを張るなど)が効果的