

Warning

# 宮城県で

## 高病原性鳥インフルエンザの 疑似患畜を確認！（家きん23例目）

【概要】農場から通報、簡易検査及び遺伝子検査で陽性  
・3月26日 あひる(あいがも)飼養農場 約9,000羽

### 【野鳥における事例も増加】

・陽性確認：1道15県125例(野鳥111例、環境試料14例)  
北海道・宮城県・山形県・鹿児島県・新潟県・福岡県・群馬県  
福島県・大分県・高知県・徳島県・愛媛県・千葉県・熊本県・富山県・岩手県で陽性事例

## 渡り鳥の北帰行はまだ継続しています!!

**これまで発生がない地域でも引き続き警戒が必要です。**

農場における病原体侵入防止対策、飼養家きんの健康観察・  
異状を認めた場合の早期通報等の徹底をお願いします。

### <高病原性鳥インフルエンザの症状>

- ・肉冠や肉垂が紫色(チアノーゼ)になる
- ・出血、壊死
- ・顔面の腫れ、むくみ
- ・産卵低下または停止
- ・神経症状、下痢等
- ・高い死亡率

### 【通報時に必要な情報】

#### 異常家きん発見鶏舎

- ①鶏舎名・飼養羽数・日齢
- ②死亡羽数・衰弱羽数
- ③鶏舎のどの辺で死亡していたか
- ④過去21日間の死亡羽数

#### その他の鶏舎

- ①鶏舎ごとの飼養羽数
- ②鶏舎ごとの過去7日間の死亡羽数



肉冠の壊死  
肉垂のチアノーゼ

**死亡鶏は検査のため  
必ず保管しておいてください！**

鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

Warning

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで  
電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728  
夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018

## 令和7年シーズンの発生状況

これまでに**23事例・552万羽**※が殺処分の対象に

※ 疑似患畜確認時の羽数


| 都道府県 | 発生件数 |
|------|------|
| 北海道  | 5    |
| 青森県  |      |
| 岩手県  | 1    |
| 宮城県  | 1    |
| 秋田県  |      |
| 山形県  |      |
| 福島県  |      |
| 茨城県  | 1    |
| 栃木県  |      |
| 群馬県  |      |
| 埼玉県  | 1    |
| 千葉県  | 2    |
| 東京都  |      |
| 神奈川県 |      |
| 新潟県  | 2    |
| 富山県  |      |
| 石川県  |      |
| 福井県  |      |
| 山梨県  |      |
| 長野県  |      |
| 岐阜県  | 1    |
| 静岡県  |      |
| 愛知県  |      |
| 三重県  | 1    |
| 滋賀県  |      |
| 京都府  | 1    |
| 大阪府  |      |
| 兵庫県  | 2    |
| 奈良県  |      |
| 和歌山県 |      |
| 鳥取県  | 1    |
| 島根県  |      |
| 岡山県  | 1    |
| 広島県  |      |
| 山口県  |      |
| 徳島県  |      |
| 香川県  | 1    |
| 愛媛県  |      |
| 高知県  |      |
| 福岡県  |      |
| 佐賀県  |      |
| 長崎県  |      |
| 熊本県  |      |
| 大分県  |      |
| 宮崎県  | 2    |
| 鹿児島県 |      |
| 沖縄県  |      |

| 発生件数 | 地図の色 |
|------|------|
| 1件   | 緑    |
| 2件以上 | 黄    |
| 5件以上 | 赤    |

### 今回発生

宮城県角田市

あひる（あいがも）：約9,000羽



|        |    |
|--------|----|
| 発生都道府県 | 15 |
| 合計発生件数 | 23 |