

ねぎ害虫防除基準掲載農薬一覧

農薬名	RACコード	有効成分名	本剤の使用回数	当該成分を含む農薬の総使用回数	適用害虫名			
					ネギアザミウマ	ハモグリバエ類	クロバネキノコバエ類	シロイチモジヨトウ
フォース粒剤	3A	テフルトリン	1	1			○	
モスピラン粒剤	4A	アセタミプリド	1	3※1	○			
ベストガード粒剤	4A	ニテンピラム	1 (は種時)	4※2	○	○※a		
			1 (定植時)		○	○※a		
			3		○	○※a		
アクタラ顆粒水溶剤	4A	チアメトキサム	3	4※3	○			
ダントツ粒剤	4A	クロチアニジン	1 (は種時)	4※4	○	○※a		
			1 (植付時)		○	○※a		
			4		○	○※a		
ダントツ水溶剤	4A	クロチアニジン	4	4※4	○	○※a		
スピノエース顆粒水和剤	5	スピノサド	3	3	○※b			○
アフーム乳剤	6	エマメクテン安息香酸塩	3	3		○		○
アニキ乳剤	6	レピメクチン	3	3	○	○		○
コルト顆粒水和剤	9B	ピリフルキナゾン	3	3	○			
フェニックス顆粒水和剤	28	フルベンジアミド	3	3				○
プレバソンフロアブル5	28	クロラントラニプロール	1 (育苗期後半～定植当日)	4※5		○		
			3			○		○
ベネビアOD	28	シアントラニプロール	3	4※6	○※b	○		○
ウララDF	29	フロニカミド	3	3	○			
プレオフロアブル	UN	ピリダリル	4	4	○			○
ファインセーブフロアブル	UN	フロメトキン	2	2	○※b	○※a		

※1 は種時土壌混和は1回以内、植付時土壌混和及び定植当日までの株元散布は合計1回以内

※2 定植時までの処理は1回以内、株元処理及び水溶剤の散布は合計3回以内

※3 定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内 ※4 定植時までの処理は1回以内

※5 灌注は1回以内、散布は3回以内 ※6 定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内

※a ネギハモグリバエ適用 ※b アザミウマ類適用