

## ふじさんアジサイの主な品種

### ふじさんアジサイ'あかね' (品種名: 山梨 24-1 農林水産省登録出願番号: 第31434号)

- 開花期間(観賞期間): 8月上旬~10月中旬
- 秋の花色が赤紫色に変化し、鮮やかである。茎が柔らかく、倒伏しやすい性質がある。


花色変化



### ふじさんアジサイ'ほくと' (品種名: 山梨 22-1 農林水産省登録出願番号: 第32405号)

- 開花期間(観賞期間): 7月中旬~10月中旬
- 花の咲く時期が早い。


花色変化



### ふじさんアジサイ'ライムライト' (品種名: ライムライト)

- 開花期間(観賞期間): 8月上旬~10月中旬
- 樹勢は旺盛で、倒伏しにくく、花基本数も多い。

花色変化



※開花期間および花色変化は、標高や気象条件などにより、異なる場合があります。  
 ※農林水産省登録出願番号の付いている品種の無断増殖及び第3者への譲渡は固くお断りします。

問い合わせ先		
中北 農務事務所	農業農村支援課	TEL 0551-23-3291
峡東 農務事務所	農業農村支援課	TEL 0553-20-2830
峡南 農務事務所	農業農村支援課	TEL 055-240-4131
富士・東部 農務事務所	農業農村支援課	TEL 0554-45-7832
総合農業技術センター	農業革新支援スタッフ	TEL 0551-28-2933

## 令和元年度 ふじさんアジサイ栽培マニュアル (飾花用苗)

発行 令和2年3月  
 作成 山梨県花き振興協議会

### ふじさんアジサイって何?

- ふじさんアジサイは、日本原産の落葉低木ノリウツギの仲間です。
- 一般に花穂の形状が円錐型のものを、ピラミッドアジサイと呼び、山梨県で生産されているものを「ふじさんアジサイ」と命名しました。

### ふじさんアジサイの特徴は?

- 4月頃から伸びた枝の先端に花芽が付き、その年の夏に開花します。花の鑑賞期間は、開花から2~3ヶ月程度です。
- 花色は、白色からピンク色、赤系色に変化します。
- 日当たりの良い場所を好みます。



1年目の開花時の生育

総合農業技術センター高冷地野菜花き振興センターのふじさんアジサイ (北杜市明野町)

2年目の開花時の生育

暦

1年目												2年目					
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	...



主な作業



鉢上げ準備 用土作成(参考)

- ・赤玉土
  - ・鹿沼土
  - ・ピートモス
  - ・パーライト
  - ・バーミキュライト
- 以上5種類の等量混合



鉢替え前に2節を残し  
剪定を行います

鉢替えは、5号プラ鉢へ

約10日後に施肥を



隣どうしの葉等が触れ  
合わないよう、生育  
に応じて鉢間隔を広げ  
ます。

夏期に害虫等が着きや  
すくなるので防除しま  
しょう



花穂は越冬の前に  
切除しておきます

秋以降は追肥は  
必要ありません



春期の出荷は、  
出荷前に2節を  
残し剪定を行  
います



出荷時に必ず品  
種保護の徹底の  
ためラベルを付  
けましょう

温度管理

基本的に、通年露地栽培可能です。出荷までの栽培期間の短縮化などの場合は、施設栽培も可能です。

水管理

特に、夏期は水切れをしないようにしましょう。また、冬期でも水切れには注意しましょう。

施肥管理

施肥のタイミングは、鉢替えおおむね10日後で、ロングトータル花き1号（100日タイプ）などの緩効性肥料を施します。施肥量は、5号鉢当たり4gを目安とします

病害虫  
防除

農薬の使用に当たっては、樹木類に登録のある農薬を使用します。  
高温時、花穂が出始めから開花時には、ハダニ、ホコリダニ類、アザミウマ類の発生が多く見られるため、薬剤防除を行います。