

신형 코로나바이러스 백신 접종 후의 주의점

**백신 접종을 받은 후에,
15분이상 ※은
접종회장에 앉아서
상태를 관찰해 주십시오.**



※과거에 심한 알레르기 증상이 있으셨던 분들은, **30분이상.**

※차로 귀가하는 분도 30분 정도는 상태를 관찰해 주십시오.

기다리는 중에도 감염방지대책을 부탁드립니다.
(마스크를 착용한다, 옆 사람과 거리 두기, 대화를 자제한다 등)

⚠ 주의

대기 중에 다음과 같은 증상이 나타났을 경우, 아나필락시스 (접종 후 단시간에 급속하게 일어나는 심한 알레르기 반응)의 염려가 있습니다.

⇒ 대기구역의 담당자에게 이상을 전하고 도움을 받으세요.



● 두드러기, 가려움
피부가 빨개짐



● 호흡곤란, 기침,
제체기, 콧물



● 심한 복통, 구토



● 혈압저하, 쓰러짐

접종 후, 부반응이 나오는 경우가 있습니다

부반응은, 면역이 잘 이루어지는 반응의 나타남이며, 몸이 병원체와 싸울 준비를 하고있다는 증거입니다.

증상	발현비율
접종부위의 통증, 나른함, 두통	50% 이상
근육통, 오한, 관절통, 설사, 발열, 접종부위의 붓기	10~50%
메스꺼움, 구토	1~10%

※ 이러한 증상은 일시적인 것이며, 수일 이내에 가라앉는 것이 대부분입니다.

실제로 접종을 받은 사람(의사, 간호사)의 체험으로

처음에는 불안했지만 . . .

이렇게 하면 OK!

접종한 날 밤에 아파서
어깨가 안 올라갔다.
아파서 돌아눕지를 못했다.



무거운 것을 들지 않도록
하고, 괴로우면 진통제를
사용합니다.



주사 맞은 다음날 온몸
마디마디가 아프고,
나른하다 . . .



무리하지 말고 안정을 취
하며, 일은 쉴 수 있다면
쉬도록 합니다.

다음날에 38.6도의
열이 났다!



일을 쉬고, 괴로우면 해열
제를 사용합니다.

모든 사람이 수일 이내에, 증상이 누그러졌습니다!

시판의 진통제, 해열제※를 준비해 두면 안심입니다.

※ 아세트아미노펜, 이부프로펜, 록스프로펜

※ 자세한 것은 약국·약점에서 상담을!

2 ~ 3일 지나도 좋아지지 않고, 증상이 불안한 분은 . . .

야마나시현 신형 코로나 백신 전문상담 다이얼 **092-687-5164**

- 토일공휴일을 포함한 매일 9:00부터 24:00까지
- 전문적인 지식을 가지고 있는 간호사와 약사가 상담에 대응합니다.