



診察・ケア時の個人防護具（PPE）

Ver.1

一般外来診察（問診・診療の際は患者との間隔を 1.5～2.0m開ける）		
患者	職員 PPE	終了後
マスクあり 	サージカルマスク + 必要時手袋  （湿性生体物質に触れる）	手指衛生 
マスクなし  ※マスク着用を促す	サージカルマスク + ゴーグル + 必要時手袋  （湿性生体物質に触れる）	手指衛生 
救急対応  基本は患者にサージカルマスクを装着してもらうこと！		
サージカルマスク+ ゴーグル + 手袋 + 袖なしエプロン 		診療後は手指衛生 肘までの手洗い or 消毒 
エアロゾル発生*の可能性がある処置/陽性例（疑似症例）を含む入院中 （*気道吸引・気管内挿管・抜管・気管切開・気管支鏡・上気道検体採取 等）		
ゴーグル + 手袋 + ガウン + キャップ+ N-95 * エアロゾル発生リスクが低い場合はサージカルマスク 		手指衛生 
COVID-19 陽性例や疑似症例の気管内挿管・抜管・気管支鏡、手術に関して ※タイベックスーツ®の着用には正しく脱げることが求められる		
タイベック装着 		手指衛生 シャワーもよい 